

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(CÔTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36.01.74

ABONNEMENT ANNUEL: 57 F.

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94 Y

SUPPLÉMENT AU BULLETIN N° 93

(BULLETIN CÉRÉALES N° 5)

26 AVRIL 1984

BLE D'HIVER

SITUATION ACTUELLE

Les températures élevées de ces derniers jours ont accéléré le développement de la végétation. Les cultures ont souvent atteint le stade 7 (2 noeuds).

Maladies du pied : les infestations du piétin verse sont généralement faibles, le rhizoctone est beaucoup plus fréquent.

Maladies du feuillage : les attaques de septoriose demeurent limitées, l'oïdium est jusqu'ici rarement signalé, rouille brune et rouille jaune sont inexistantes.

Les premiers pucerons apparaissent en culture, les niveaux d'infestation sont extrêmement bas.

NOS PRECONISATIONS :

Les conditions climatiques actuelles n'étant pas particulièrement favorables aux maladies, lorsque cela est possible, retardez le premier traitement fongicide jusqu'au stade 8 (dernière feuille visible et encore enroulée). Cette intervention sera plus efficace contre les maladies du feuillage et contre d'éventuelles contaminations tardives de piétin verse.

Nous rappelons qu'au stade 7 (2 noeuds), les cultures doivent faire l'objet d'une surveillance attentive pour décider du premier traitement fongicide. Les préconisations du précédent bulletin demeurent valables :

1 - Parcelles à potentiel élevé (plus de 60 quintaux) :

- * si plus de 1 talle sur 4 porte des symptômes de piétin verse ou de rhizoctone, intervenez dès que possible.
- * si moins de 1 talle sur 4 est touchée, attendez le stade 8 pour intervenir.

P.14.5

2 - Parcelles à potentiel moyen :

N'intervenez que si 1 talle sur 4 est atteinte par les maladies du pied.

CHOIX DU FONGICIDE : Utilisez un fongicide polyvalent renfermant benomyl, carbendazime ou méthylthiophanate associé à une matière active présentant une certaine efficacité contre la septoriose. En présence d'oïdium ou sur variétés sensibles à l'oïdium et aux rouilles, employez un fongicide également efficace contre ces affections.

L'adjonction d'un insecticide est déconseillée.

ORGE D'HIVER

SITUATION ACTUELLE

Stade végétatif moyen : stade 8 : la plupart des parcelles sont touchées par la rhynchosporiose. Les conditions climatiques sont aujourd'hui défavorables à son évolution, mais le retour des pluies entraînerait de nouvelles contaminations sur les dernières feuilles à présent dégagées.

Rouille naine et oïdium sont fréquents.

TRAITEMENTS FONGICIDES :

Dans les situations tardives et si cela n'a pas déjà été fait, intervenez sans attendre avec un fongicide polyvalent efficace contre la rhynchosporiose, la rouille naine et l'oïdium.

Si l'évolution de l'état sanitaire le justifiait, une nouvelle intervention fongicide devrait être envisagée au gonflement.